



Dr. Giuliano Freitas
CATARATA E REFRACTIVA | Oftalmologista - CRM/MG 43.298

Cuidados Anestésicos

A cirurgia de catarata sob anestesia tópica ("colírio anestésico") e sedação leve, costuma ser realizada em poucos minutos. Todo o procedimento é supervisionado por Anestesiologista, oferecendo maior segurança e conforto aos pacientes.

O(a) paciente é admitido(a) ao centro cirúrgico em jejum de 2 horas para líquidos claros, como água ou chá, sendo de 8 horas para sólidos ou leite.

Exames laboratoriais, eletro/ecocardiograma ou de imagem não são solicitados de rotina para a maioria dos casos. Pacientes hipertensos ou diabéticos, em bom controle dessas doenças, devem fazer uso das medicações rotineiras. Da mesma forma, usuários de aspirina, clopidogrel ou warfarina não necessitam suspender o uso dessas medicações.

Cerca de uma hora após o término da cirurgia, o paciente costuma receber alta para casa. Faz-se necessária a presença de acompanhante, maior de idade.

Exceções a estas regras são prontamente identificadas por ocasião da avaliação pré-anestésica, quando as recomendações apropriadas são apresentadas ao paciente.

Cirurgias oftalmológicas, outras, como o implante de Anel de Ferrara ou *Crosslinking* contam com cuidados anestésicos semelhantes aos descritos para a cirurgia de catarata, sendo que as diferenças são devidamente discutidas na avaliação pré-anestésica, caso a caso.

Quaisquer dúvidas relativas aos cuidados anestésicos devem ser comunicadas à equipe, pois estaremos prontos a ajudar.

Adaptado de:

Macias AA, Bayes J, McGoldrick KE et al. Anesthesia for elective eye surgery. Wlatham-MA: UpToDate, 2015.